

ECRI COME

Banque d'épreuves communes

aux concours des Ecoles

esc bordeaux / esc marseille / icn nancy / esc reims / esc rouen / esc toulouse

CONCOURS D'ADMISSION

option scientifique

MATHÉMATIQUES

Année 2003

Aucun instrument de calcul n'est autorisé.

Aucun document n'est autorisé.

L'énoncé comporte 6 pages

Les candidats sont invités à soigner la présentation de leur copie, à mettre en évidence les principaux résultats, à respecter les notations de l'énoncé, et à donner des démonstrations complètes (mais brèves) de leurs affirmations.

**Tournez la page
S.V.P**

Exercice 1

On considère la suite de nombres réels $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence :

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + u_n^2 \\ u_0 &= a, a \in \mathbb{R}_+^\times\end{aligned}$$

Partie 1 Convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

1. Montrer que cette suite est strictement positive et monotone.
2. Montrer que cette suite diverge vers l'infini.

Partie 2 Comportement asymptotique de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $v_n = \frac{1}{2^n} \ln u_n$

1. Prouver que pour tout entier n de \mathbb{N} : $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2^{n+1}} \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)$.
En déduire que quels que soient les entiers naturels p et n :

$$0 < v_{n+p+1} - v_{n+p} \leq \frac{1}{2^{n+p+1}} \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)$$

2. En déduire que quels que soient les entiers naturels k et n

$$0 < v_{n+k+1} - v_n \leq \frac{1}{2^n} \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)$$

3. Démontrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, puis qu'elle converge vers une limite notée α .
4. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \exp(\alpha 2^n)$
En passant à la limite pour n fixé dans l'encadrement 2.2, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exp(\alpha 2^n) \leq u_n + 1$$

En déduire, lorsque n tend vers l'infini, l'équivalent suivant :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \exp(\alpha 2^n)$$

5. On pose : $\beta_n = \exp(\alpha 2^n) - u_n$.
Montrer que la suite $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et qu'elle vérifie la relation suivante :

$$2\beta_n - 1 = (\beta_{n+1} + \beta_n^2 - \beta_n) \exp(-\alpha 2^n)$$

6. Prouver enfin que lorsque n tend vers l'infini : $u_n = -\frac{1}{2} + \exp(\alpha 2^n) + o(1)$

Exercice 2

Dans cet exercice, n désigne un entier naturel non nul, et on adopte les notations suivantes :

$\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$: ensemble des matrices carrées d'ordre n , à coefficients réels.

$S_n(\mathbb{R})$: le sous-espace vectoriel de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices symétriques.

$A_n(\mathbb{R})$: le sous-espace vectoriel de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices antisymétriques.

On rappelle qu'une matrice A de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ est antisymétrique si ${}^t A = -A$, ${}^t A$ étant la matrice transposée de A .

On définit les applications tr et φ par :

Pour toute matrice $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ et B de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$, $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^t AB)$

1. Montrer que tr est une application linéaire de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ dans \mathbb{R} qui vérifie :

$$\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}), \forall B \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}), \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

2. Prouver que tr est surjective. Donner la dimension du noyau de tr .

3. Prouver que φ définit un produit scalaire dont la norme associée, $\|\cdot\|$, vérifie :

$$\forall A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}), \quad \|A\|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2$$

4. Etablir que : $\forall A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{R}), \quad |\text{tr} A| \leq \|\sqrt{n}A\|$

5. Démontrer que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont deux sous-espaces supplémentaires orthogonaux de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$ pour φ .

6. Soit $M = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. En déduire que pour toute matrice $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ de $\mathfrak{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\min_{M \in S_n(\mathbb{R})} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{i,j} - m_{i,j})^2 \text{ existe et vaut } \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (a_{i,j} - a_{j,i})^2$$

Problème

On rappelle que :

- La fonction Γ est la fonction définie pour $x > 0$ par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} \exp(-t) dt$.
 - Si X suit une loi normale et si α est un réel non nul alors αX suit également une loi normale.
- On admettra que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

Partie 1

On considère la variable aléatoire $Y_n = \sum_{k=1}^n X_k^2$ où X_1, X_2, \dots, X_n sont n variables aléatoires indépendantes, suivant toutes une loi normale centrée réduite.

1. Déterminer la fonction de répartition F_{Y_1} de $Y_1 = X_1^2$.
2. En déduire que Y_1 est une variable aléatoire qui suit une loi gamma dont on précisera les paramètres.
3. Justifier que Y_n suit une loi gamma de paramètres $(2, \frac{n}{2})$.
4. Donner les valeurs de l'espérance $E(Y_n)$ et de la variance $V(Y_n)$ de Y_n .
5. On dit alors que Y_n suit une loi du *Chi-deux* à n degrés de liberté, notée $\chi^2(n)$.
Soient G_n la fonction de répartition de Y_n et β un réel dans l'intervalle $]0, 1[$.
Montrer qu'il existe un réel unique t tel que $G_n(t) = \beta$. Ce réel est alors noté $\chi_\beta^2(n)$.

Dans la suite du problème on considère une suite $(X_i)_{i \geq 1}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant une même loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$. L'objet des questions suivantes est de déterminer une estimation ponctuelle (partie 2) puis une estimation par intervalle de confiance (parties 3 et 4) de la variance σ^2 . Si g

est une fonction de n variables réelles, et si $Z_n = g(X_1, \dots, X_n)$, on rappelle que :

- g est un estimateur de θ (Z_n est un estimateur de θ) lorsque $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(Z_n) = \theta$.
- L'estimateur Z_n est dit sans biais lorsque pour tout n entier naturel non nul : $E(Z_n) = \theta$
- L'estimateur Z_n est dit convergent lorsque : $\lim_{n \rightarrow +\infty} V(Z_n) = 0$

Partie 2 Estimation ponctuelle de σ^2 .

Pour n entier naturel non nul, on pose : $F_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - F_n)^2$

1. Montrer que $(F_n)_{n \geq 1}$ est un estimateur convergent sans biais de m .
2. Soit n un entier naturel non nul.

(a) Démontrer que : $V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2$

puis que : $V_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 - (F_n - m)^2$

(b) Prouver que : $E(V_n) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

(c) En déduire un estimateur sans biais de σ^2 .

Partie 3 Estimation par intervalle de confiance de σ^2 , m étant connue.

Pour n entier supérieur à 2, on pose :

$$U_n = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 \text{ et } T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$$

1. Justifier que U_n suit une loi du *Chi-deux* à n degrés de liberté.
2. Soit $\alpha \in]0, 1[$. Montrer l'égalité des événements :

$$\left[\frac{nT_n}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)} \leq \sigma^2 \leq \frac{nT_n}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} \right] \text{ et } \left[\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \leq U_n \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \right]$$

En déduire que la probabilité de l'événement $\left[\frac{nT_n}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)} \leq \sigma^2 \leq \frac{nT_n}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} \right]$ est $1 - \alpha$.

Partie 4 Estimation par intervalle de confiance de σ^2 , m étant inconnue.

$\mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices à n lignes et 1 colonne à coefficients réels et $Id_{\mathbb{R}^n}$ l'identité de \mathbb{R}^n .

Pour n entier supérieur à 2, on pose :

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - M_n)^2, \quad U_n = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - M_n)^2$$

1. Soit φ l'endomorphisme de \mathbb{R}^n dont la matrice dans la base canonique est A définie par :

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} a_{i,i} &= n-1 \\ a_{i,j} &= -1 \text{ si } i \neq j \end{aligned}$$

et B la matrice de $\mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dont tous les éléments sont égaux à 1.

- (a) Justifier que A est une matrice diagonalisable.
- (b) Calculer le produit AB , en déduire une valeur propre de A et un vecteur propre de A associé à cette valeur propre.
- (c) Montrer que : $\dim \text{Im}(\varphi - nId_{\mathbb{R}^n}) = 1$

(d) En déduire la dimension de $\ker(\varphi - nId_{\mathbb{R}^n})$, les valeurs propres et les sous-espaces propres de la matrice A .

(e) Soit $W = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$ la matrice des coordonnées d'un vecteur propre de φ associé à la valeur propre n .

Prouver que : $\sum_{i=1}^n w_i = 0$.

(f) Justifier l'existence d'une matrice P inversible dont la dernière colonne est proportionnelle à B et d'une matrice diagonale D que l'on déterminera, telle que : $P^{-1}AP = D$ avec ${}^tP = P^{-1}$
(On ne demande pas la matrice P).

(g) On note $(p_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ les coefficients de la matrice tP ; montrer que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n-1\}, \quad \sum_{j=1}^n p_{i,j} = 0$$

puis que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{j=1}^n p_{i,j}^2 = 1$

2. Soit q l'application de $\mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dans \mathbb{R} définie par :

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad q(X) = {}^tXMX \quad \text{où} \quad M = \frac{1}{n}A$$

(a) On pose $Y = {}^tPX$; montrer que : $q(X) = \frac{1}{n} YDY$

puis que : $q(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j)^2$

(b) En utilisant l'écriture $q(X) = \frac{1}{n} YDY$, montrer que : $q(X) = \sum_{i=1}^{n-1} (\sum_{j=1}^n p_{i,j}x_j)^2$

3. Pour tout i de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$, on pose : $Y_i = \sum_{j=1}^n p_{i,j}X_j$

(a) Justifier que Y_i suit une loi normale puis montrer que $E(Y_i) = 0$ et $V(Y_i) = \sigma^2$.

(b) En utilisant les résultats de la question 4.2, montrer que : $U_n = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n-1} Y_i^2$

(c) En admettant que les $(Y_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ sont mutuellement indépendantes, justifier que U_n suit une loi du *Chi-deux* à $n-1$ degrés de liberté.

(d) Désormais, α désigne un réel appartenant à $]0, 1[$. Montrer que les événements :

$$\left[\frac{(n-1)S_n}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S_n}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] \quad \text{et} \quad \left[\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \leq U_n \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \right]$$

sont égaux.

(e) En déduire que la probabilité de l'événement

$$\left[\frac{(n-1)S_n}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S_n}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right]$$

est $1 - \alpha$.