

Programme ESC d'E.M.LYON

CONCOURS D'ENTREE 2002

MATHEMATIQUES

1ère épreuve (option économique)

Les candidats ne doivent pas faire usage d'aucun document; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

EXERCICE 1

On considère les deux matrices carrées réelles d'ordre quatre suivantes :

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Les questions 2 et 3 sont indépendantes entre elles.

- (a) Calculer K^2 .
(b) En déduire que la matrice K est inversible et déterminer K^{-1} .
(c) Montrer que la matrice K n'admet aucune valeur propre réelle.
- Soient a et b deux nombres réels. On note M la matrice définie par $M = aI + bK$.
 - Montrer que : $M^2 = -(a^2 + b^2)I + 2aM$.
 - En déduire que, si $(a, b) \neq (0, 0)$, alors la matrice M est inversible, et exprimer son inverse comme combinaison linéaire de I et M .
 - Application* : donner l'inverse de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 1 + \sqrt{2} & 1 & -2 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -2 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

- On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ la base canonique de \mathbb{R}^4 , et f l'endomorphisme de \mathbb{R}^4 associé à la matrice K relativement à la base \mathcal{B} . On considère les quatres éléments suivants de \mathbb{R}^4 :

$$v_1 = e_1, \quad v_2 = f(e_1), \quad v_3 = e_3, \quad v_4 = f(e_3).$$

- Montrer que la famille $\mathcal{C} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ est une base de \mathbb{R}^4 .

- (b) Exprimer $f(v_1), f(v_2), f(v_3), f(v_4)$ en fonction de v_1, v_2, v_3, v_4 et en déduire la matrice K' associée à f relativement à la base \mathcal{C} .
- (c) Déterminer la matrice de passage P de la base \mathcal{B} à la base \mathcal{C} .
- (d) Rappeler l'expression de K' en fonction de K, P et P^{-1} .

EXERCICE 2

On considère, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$, la fonction polynômiale $P_n : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie, pour tout $x \in [0; +\infty[$, par :

$$P_n(x) = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k x^k}{k} = -x + x^2 + \dots + \frac{-x^{2n-1}}{2n-1} + \frac{x^{2n}}{2n}.$$

I. Etude des fonctions polynômiales P_n

1. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$ et tout $x \in [0; +\infty[$:

$$P'_n(x) = \frac{x^{2n} - 1}{x + 1}, \text{ où } P'_n \text{ désigne la dérivée de } P_n.$$

2. Etudier, pour $n \in \mathbb{N}^\times$, les variations de P_n sur $[0; +\infty[$ et dresser le tableau de variations de P_n .
3. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$: $P_n(1) < 0$.

- (a) Vérifier, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$ et tout $x \in [0; +\infty[$:

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + x^{2n+1} \left(-\frac{1}{2n+1} + \frac{x}{2n+2} \right).$$

- (b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$: $P_n(2) \geq 2$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$, l'équation $P_n(x) = 0$, d'inconnue $x \in [1; +\infty[$, admet une solution et une seule, notée x_n , et que :

$$1 < x_n \leq 2.$$

5. Ecrire un programme en langage Pascal qui calcule et affiche une valeur approchée décimale de x_2 à 10^{-3} près.

II. Limite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^\times}$

1. Etablir, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$ et tout $x \in [0; +\infty[$:

$$P_n(x) = \int_0^x \frac{t^{2n} - 1}{t + 1} dt.$$

2. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$:

$$\int_1^{x_n} \frac{t^{2n} - 1}{t + 1} dt = \int_0^1 \frac{1 - t^{2n}}{t + 1} dt.$$

3. Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$ et tout $t \in [1; +\infty[$:

$$t^{2n} - 1 \geq n(t^2 - 1).$$

4. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^\times$:

$$\int_1^{x_n} \frac{t^{2n} - 1}{t + 1} dt \geq \frac{n}{2}(x_n - 1)^2,$$

puis :

$$0 < x_n - 1 \leq \frac{\sqrt{2 \ln 2}}{\sqrt{n}}.$$

5. Conclure quant à la convergence et à la limite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^\times}$.

EXERCICE 3

1. Etude préliminaire

On admet, pour tout entier naturel k et tout réel x de $[0; 1[$, que la série $\sum_{n \geq k} C_n^k x^n$ est convergente et

on note $s_k(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} C_n^k x^n$.

(a) Vérifier, pour tout réel x de $[0; 1[$:

$$s_0(x) = \frac{1}{1-x} \text{ et } s_1(x) = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

(b) Pour tout couple d'entiers naturels (n, k) tel que $k < n$, montrer :

$$C_{n+1}^{k+1} = C_n^k + C_n^{k+1}.$$

(c) Pour tout entier naturel k et tout réel x de $[0; 1[$, déduire de la question précédente :

$$s_{k+1}(x) = x s_k(x) + x s_k(x).$$

(d) Montrer, par récurrence :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, 1[, \quad s_k(x) = \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}.$$

2. Etude d'une expérience aléatoire.

On considère une urne contenant une boule noire et quatre boules blanches. On effectue l'expérience aléatoire suivante :

- On commence par tirer des boules de l'urne une à une avec remise jusqu'à obtenir la boule noire (que l'on remet aussi dans l'urne).
On définit la variable aléatoire N égale au nombre de tirages avec remise nécessaires pour obtenir la boule noire.
- Puis, si N prend une valeur entière positive non nulle notée n , on réalise alors une seconde série de n tirages dans l'urne, toujours avec remise.
On définit la variable aléatoire X égale au nombre de fois où la boule noire a été obtenue dans cette seconde série de tirages.

- (a) Déterminer la loi de la variable aléatoire N . Donner son espérance.
- (b) Soit $k \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^\times$. Déterminer la probabilité conditionnelle $P(X = k/N = n)$.
- (c) Vérifier : $P(X = 0) = \frac{4}{9}$.
- (d) En utilisant l'étude préliminaire, montrer :

$$\forall k \in \mathbb{N}^\times, \quad P(X = k) = \frac{25}{36} \left(\frac{4}{9}\right)^k.$$

- (e) Montrer que X admet une espérance $E(X)$ et calculer $E(X)$.
- (f) Montrer : $\forall k \in \mathbb{N}, P(X \leq k) = 1 - \frac{5}{9} \left(\frac{4}{9}\right)^k$.

3. Étude d'une variable aléatoire à densité

On note $a = -\frac{\ln 9 - \ln 5}{\ln 9 - \ln 4}$ et on définit la fonction F sur \mathbb{R} par :

$$\begin{cases} F(x) = 1 - \frac{5}{9} \left(\frac{4}{9}\right)^k & \text{si } x \in [a; +\infty[\\ F(x) = 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On rappelle : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \left(\frac{4}{9}\right)^x = e^{x \ln \frac{4}{9}}$.

- (a) Montrer que F est la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité, notée Y .
- (b) Déterminer une densité f de Y .
- (c) Déterminer une primitive de la fonction g définie sur \mathbb{R} par $g(x) = x e^{x \ln \frac{4}{9}}$.
- (d) Montrer que Y admet une espérance $E(Y)$ et calculer $E(Y)$.